

ANTAFLOX® crema

ANTAFLOX® crema è un prodotto a base di escina, bromelina e arnica utile nel trattamento locale delle alterazioni funzionali del microcircolo (sintomi correlati all'insufficienza venosa e linfatica periferica, tromboflebiti e flebiti superficiali, stati di infiammazione delle varici, ematomi, stati di fragilità capillare, gambe pesanti, tumefazione ed edema delle gambe, varici recidive dopo intervento operatorio; sindrome post- flebitica, cellulite) e in tutti quei casi in cui il benessere cutaneo è compromesso (per attività sportiva o cause accidentali). Utile quindi, sia nell'adulto che nel bambino, nel trattamento di traumi, contratture e stiramenti muscolari, fratture, lussazioni, contusioni e distorsioni osteoarticolari, ecchimosi.

L'**escina**, principio attivo dell'estratto di ippocastano, mostra attività antinfiammatoria, antiedemigena e capillarotropica. Riduce l'azione dell'elastasi e della ialuronidasi, enzimi che in caso di flogosidegradano la struttura interna dei vasi, indebolendo l'endotelio dei capillari, generando fenomeni vasculoematici responsabili della formazione dell'edema. L'azione su queste idrolasi proinfiammatorie garantisce il ripristino fisiologico di resistenza e permeabilità dei vasi (effetto antiedemigeno).

L'escina quindi, aumenta la resistenza dei capillari e ne riduce la permeabilità; esercita un'azione antiedemigena, supportata dalla capacità di intervenire sul ricambio elettrolitico locale, favorendo la rimozione dei liquidi interstiziali accumulatisi. È inoltre un coadiuvante nelle infiammazioni traumatiche con edema delle strutture periarticolari, a cui spesso sono associati tumefazioni ed ematomi, quindi sia nelle fasi iniziali dell'infiammazione, nell'edema di natura non infiammatoria (trasudato), sia nelle successive fasi flogistiche acute, nell'edema di natura infiammatoria (essudato).

L'azione capillarotropica e decongestionante si esplica sia nelle condizioni di **insufficienza venosa periferica**, sia nelle **sindromi flebitiche** (questo perché l'aumento del tono delle vene si ripercuote positivamente sul ritorno venoso al cuore). Un minore ristagno di sangue in periferia oltre a ridurre il gonfiore degli arti inferiori, determina una spiccata azione preventiva della **cellulite**. Quest'azione di drenaggio capillarotropico, unitamente a proprietà antinfiammatorie e a una lieve attività antitrombotica, rende gli estratti di ippocastano standardizzati in escina, particolarmente utili nei disturbi di insufficienza venosa periferica (**gonfiore, pesantezza, tumefazione ed edema delle gambe, dolori, prurito ecc.**), **varici recidive** dopo intervento operatorio e **sindromi postflebitiche, cellulite e fragilità capillare**.

Il **Fitosoma** è una forma complessata del principio attivo (escina) che ne migliora l'assorbimento, l'efficacia e la tollerabilità cutanea. Il complesso è meglio tollerato dell'escina libera ed è dotato di un effetto prolungato nel tempo. Applicato topicamente, *Escina beta-sitosterol* è un ingrediente sicuro. Non causa problemi di intolleranze, allergie o irritazioni. L'escina fitosoma ha anche **proprietà disarrossante e lenitiva**. È molto utile per ridurre i gonfiore e l'eccessiva dilatazione delle venule, per attenuare il senso di stanchezza e riattivare la circolazione periferica.

La **bromelina** è un enzima proteolitico presente nel succo, nella polpa e nel gambo dell'**ananas**. Essa è utilizzata da anni nei processi infiammatori dovuti a **traumi sportivi**, artrite reumatoide, flebite, cellulite. Oltre a questa sua azione antinfiammatoria, anche la bromelina vanta un'attività antiedemigena (**riduce il gonfiore dopo un trauma**, attenua la ritenzione idrica) ed antiaggregante piastrinica (ostacola la formazione di trombi all'interno dei vasi sanguigni ed è utile in presenza di **vene varicose**).

L'**arnica** vanta proprietà principalmente antiflogistiche, esclusivamente per uso topico (applicata direttamente sulla pelle della parte malata). È l'ideale per il **massaggio sportivo**. Viene quindi consigliata sia nell'adulto che nel bambino in traumatologia in caso di **edemi post-traumatici (fratture, distorsioni, ecchimosi, contusioni, lussazioni, compressioni, ematomi, stiramenti muscolari, contratture, edemi da frattura), atrie e disturbi articolari a carattere reumatico, versamenti articolari e flebiti non ulcerative**. L'arnica va usata su cute integra e svolge un'azione lenitiva donando una sensazione di sollievo.

MODO D'USO: applicare la quantità necessaria sulle parti interessate, a cute ben deteresa, con un leggero massaggio fino a completo assorbimento. Ripetere l'applicazione 3 - 4 volte al giorno o ogni qualvolta si ritiene necessario.

AVVERTENZE: Uso esterno. Conservare in luogo fresco e asciutto. Nei casi di riconosciuta intolleranza ad uno o più ingredienti riportati evitare l'uso del prodotto. Tenere lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini. L'arnica prevede un utilizzo in assenza di lesioni cutanee o piaghe aperte.

COMPOSIZIONE: Aqua, Cetareth-20, Propylene Glycol, Cetyl Esters, Lecithin, Escin, Beta-Sitosterol, Bromelain, Maltodextrin, Arnica Montana Flower Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Disodium EDTA, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Triethanolamine.

CONFEZIONE: tubo 75 ml.